interreg Alpenrhein | Bodensee | Hochrhein

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Merkblatt Nr. 4:

Übersicht weitere Wanzenarten

Graue Feldwanze (*Rhaphigaster nebulosa*) 	• Überwinterung als Adulte • Eiablage ca. Ende Mai bis Ende Juni • Eigelege: 40 Eier • 5 Larvenstadien • 1 Generation / Jahr • Häufigste Wirtspflanzen: Laubbäume • Transparente Flügelenden sind gepunktet
Grüne Stinkwanze (*Palomena prasina)* 	• Überwinterung als Adulte • Eiablage ca. Ende Mai bis Ende Juni • Eigelege: 28 grüne Eier • 5 Larvenstadien • 1 Generation / Jahr • Häufigste Wirtspflanzen: Laubbäume
Grüne Reiswanze (*Nezara viridula)* 	• Überwinterung als Adulte • Eiablage ca. Mai bis September • Eigelege: 40-80 gelbliche Eier • 5 Larvenstadien • 2 und mehr Generationen / Jahr • Häufigste Wirtspflanzen: Beeren

Lederwanze (*Coreus marginatus*) 	• Überwinterung als Adulte • Eiablage ca. Mai bis Juni • 5 Larvenstadien • 2 Generationen / Jahr • Häufigste Wirtspflanzen: Beeren
Wiesenwanze (*Lygus sp.*) 	• Überwinterung als Adulte • Eiablage ca. Mai bis Juni • 1-2 Generationen / Jahr • Häufigste Wirtspflanzen: Gemüse
Amerikanische Kiefernwanze (*Leptoglossus occidentalis*) 	• Überwinterung als Adulte • Eiablage ca. Mai bis Juni • 5 Larvenstadien • 1 Generation / Jahr • Häufigste Wirtspflanzen: Nadelbäume

Autoren Anja Ackermann, BBZ Arenenberg; Marlis Nölly, BBZ Arenenberg; Richard Hollenstein, LZSG; David Szalatnay, Strickhof