Pflanzenschutzmail Gemüsebau

Für die Kantone St.Gallen, Thurgau und Schaffhausen


16.08.2023

Hinweise und Informationen für den Freiland-Gemüsebau (SGA), Nr. 19/2023

Allgemeine Hinweise




Nützlingsstreifen entlang einer Ackerkultur.



- Agrinatur Biodiversität auf dem Landwirtschaftsbetrieb Biodiversitätsförderflächen
- Pa. Iv. 19.475 OeLN 3.5 BFF auf Ackerflaechen ab 2024.pdf (sg.ch)

Doldenblütler



Erste Selleriebestände zeigen Symptome von Septoriabefall. Ein Befall ist zuerst auf den älteren Blättern sichtbar. Septoria benötigt für eine optimale Ausbreitung Temperaturen um 25°C und lange Blattnassdauern von 48 bis 72h.

Kreuzblütler

Der Infektionsdruck von Alternaria und Falschem Mehltau in den Kohlbeständen hält an. Zudem wurde in einigen Feldern die herdartige Ausbreitung von Ademschwärze verursacht durch das Bakterium Xanthomonas beobachtet. Ein typisches Symptom der Ademschwärze sind die V-förmigen Absterbeerscheinungen vom Blattrand her. Um der weiteren Verbreitung vorzubeugen sollten Kulturmassnahmen möglichst bei trockenen Beständen durchgeführt werden. Bei der Kohldrehherzgallmücke wurde an allen überwachten Standorten lediglich ein sehr schwacher Flug unterhalb der Schadschwelle verzeichnet. Diverse Raupen, wie Kohlweissling, Kohlmotte und zum Teil auch Kohleule sind nach wie vor aktiv. Eine frühe Behandlung, solange die Raupen noch klein sind, ist am effektivsten. Erdflöhe treten parzellenweise und vor allem an Chinakohl stark auf. Kulturkontrollen bei Jungpflanzen sind weiterhin zu empfehlen.

Weitere Kulturen

In **Lauch und Zwiebeln** wurden wieder hohe Fallenfänge bei **Thripsen** verzeichnet. Die Fallenfänge der **Lauchmotte** sind sowohl im Thurgau als auch im Rheintal unter der Schadschwelle.

In **Salatbeständen und Bohnen** wurden erneut **Blattläuse** beobachtet. Kulturkontrollen und gegebenenfalls eine Behandlung sind empfohlen. Beachtet, dass für den Einsatz von Pyrethroiden im Salat z.B. Wirkstoff Lambda-cyhalothrin (Produkte wie Karate Zeon oder Techno mit einwöchiger Wartefrist) eine Sonderbewilligung benötigt wird.



Im Broccoli-Sortenversuch sind aktuell erste Sortenunterschiede beim Befall mit Alternaria zu sehen.



Typische Symptome von Schwarzadrigkeit an Kohl.

Bilder: Vivienne Oggier und Mathias Heeb

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter Präparate oder Verfahren ergeben könnten, wird nicht übernommen. Gebrauchsanleitung beachten.

